

ЦИПРОВЕТ глазные капли

Состав и фармакологические свойства.

Содержит в качестве действующего вещества ципрофлоксацин. Препарат обладает бактерицидным и противовоспалительным свойством, имеет широкий спектр антимикробного действия, высокоэффективен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая хламидии, микоплазмы, золотистый стафилококк и синегнойную палочку, а также штаммы, резистентные к метициллину и гентамицину. Основным механизмом действия ципрофлоксацина является ингибирование ДНК-гиразы бактерий (топо-изомеразы) — X фермента, в результате чего происходит разрушение структуры ДНК и гибель бактерий. При местном применении ципрофлоксацин хорошо проникает в роговицу и переднюю камеру глаза, особенно при нарушении эпителиального слоя роговицы.

Показания к применению.

Лечение и профилактика воспалительных и инфекционных заболеваний глаз, придатков глаза у собак и кошек: острых и хронических конъюнктивитов, керато-конъюнктивитов, кератитов, язв роговицы, септических иридоциклитов, блефаритов. Лечение инфекционных заболеваний глаз, не поддающихся лечению другими антибактериальными препаратами. Профилактика инфекционных заболеваний глаз после травм и попадания инородных тел. Предоперационная и послеоперационная профилактика инфекционных осложнений в глазной хирургии и их лечение.

Противопоказания.

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к фторхинолонам. Капли глазные не следует применять котят и щенкам младше 7-дневного возраста. Ципровет капли глазные следует применять с осторожностью животным с атеросклерозом сосудов головного мозга и нарушением мозгового кровообращения.

Побочные явления.

При применении препарата согласно инструкции побочных явлений и осложнений не наблюдается. В редких случаях препарат может вызвать легкую болезненность и гиперемию конъюнктивы, зуд, слезотечение, которые проходят через 5 минут.

Дозы и порядок применения.

Препарат закапывают в пораженный глаз 4 раза по 1–2 капли в течение 7–14 дней, в зависимости от тяжести процесса.

Вид и масса животного	Количество капель, необходимых для одной обработки
Собаки от 2 до 10 кг	1
Собаки от 10 кг и более	2
Кошки	1

При наличии обильного гнойного или слизисто-гнойного отделяемого закапывают 3–4 капли препарата, затем марлевым тампоном тщательно удаляют все отделяемое и корочки. Повторно закапывают 1–2 капли лекарственного препарата и проводят лечение. При необходимости курс повторяют.

Хранение.

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 5 до 25°C.

Форма выпуска.

Полимерный флакон-капельница 10 мл. Внешняя упаковка – картонная коробочка.

